

# Bestimmungshilfe Bläulinge (Polyommataini)

## Bläulinge

ohne orangefarbene Flecken auf den Flügelunterseiten

### Rotklee-Bläuling (*Cyaniris semiargus*)



Foto: Erk Dallmeyer

**Oberseite Männchen**  
Sehr kleine Falterart



Foto: Erk Dallmeyer

**Oberseite Weibchen**  
Flügelunterseiten sehr zeichnungsarm



Foto: Erk Dallmeyer

**Unterseite**  
hell braungrau, blaue Bestäubung, ohne Randflecken, Ringe um Flecken breiter

### Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Phengaris nausithous*)



Foto: Erk Dallmeyer

**Unterseite**  
1 Fleckenreihe auf Flügelunterseite, ohne blaue Bestäubung, Ringe um Flecken schmal

### Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Phengaris teleius*)



Foto: Frank Clemens

**Unterseite**  
2 Fleckenreihen auf Flügelunterseite

### Thymian-Ameisenbläuling (*Phengaris arion*)



Foto: Erk Dallmeyer

**Unterseite**  
Alle Flecken sehr groß

### Lungenenzian-/Kreuzenzian-Ameisenbläuling (*Phengaris alcon/rebeli*)



Foto: Erk Dallmeyer

**Oberseite**



Foto: Erk Dallmeyer

**Unterseite**

*Phengaris alcon*  
kann nur ökologisch von  
*Phengaris rebeli*  
unterschieden werden!

### Alexis-Bläuling (*Glaucopsyche alexis*)



Foto: Erk Dallmeyer

**Oberseite Männchen**

Markante Fleckenreihe auf Vorderflügel-Unterseite, smaragdgrüne Färbung der Hinterflügelbasis, Flecken auf Vorderflügel größer als auf Hinterflügel



Foto: Erk Dallmeyer

**Unterseite**

Layout: Anna-Maria Madaj

 tagfalter-monitoring.de

 HELMHOLTZ  
ZENTRUM FÜR  
UMWELTFORSCHUNG  
UFZ