

Der Wundkleebläuling (*Polyommatus dorylas*) im Alb-Wutach-Gebiet

Georg Paulus & Stefan Hafner
ABL Freiburg
27.2.2026



INHALT

- Artbestimmung
- Phänologie
- Verbreitung
- Vorkommen im Alb-Wutach-Gebiet
- Lebensraum
- Methodik Arterfassung
- Zusammenfassung




Phänologie




Bild: Christoph Bausch

Baden-Württemberg



Deutschland




Quelle: schmetterlinge-d.de

Verbreitung


Quelle: Distribution Atlas of Butterflies in Europe 2011

Polyommatus dorylas ([SCHIFFERMÜLLER], 1775)




Zoogeography: From Spain through C. and S. Europe to S. Russia and the Near East.
– ZS: Euro-Oriental species.

Conservation: RA 2. – BRF 370. – DI 19.89 %. – IUCN RL 2010: Europe NT, EU27
NT. – FFH 93/43: NL. – CRAEB: HR.




Quelle: schmetterlinge-d.de

Polyommatus dorylas ([SCHIFFERMÜLLER], 1775)




Zoogeography: From Spain through C. and S. Europe to S. Russia and the Near East.
– ZS: Euro-Oriental species.
Conservation: RA 2. – BRF 370. – DI 19.89 %. – IUCN RL 2010: Europe NT, EU27
NT. – FFH 93/43: NL. – CRAEB: HR.

Verbreitungskarte



Quelle: schmetterlinge-bw.de



Lepidoptera
Lycaenidae

Polyommatus dorylas (Denis &
Schiffermüller, 1775)
Wundkleebläuling


✅ Taxon gut untersucht, Karte nahe an der
tatsächlichen Verbreitung [MEHR INFO](#)

Rote Liste Status : NT
National prioritäre Art : -
Herkunft : INN (einheimisch)


Legende

- (●) Daten ab 2000 [standortfremd]
- (○) Daten vor 2000 [standortfremd]


Bilder



Alb-Wutach-Gebiet



Alb-Wutach-Gebiet



Waldshut: Waldkirch - Schmitzingen



Waldshut: Waldkirch - Schmitzingen



Lebensraum



20.5.22



13.10.25

Dürre



12.10.23



12.11.19



Nachweis: Fraßspuren

Methode: Fraßspurenkartierung

Datum	Frasspuren	Pflanzen	Dauer min	Bemerkung
2022/10/17 09:07:09.000	7	8	20	wenig Pflanzen, diese gut besetzt, Jordanita R
2022/10/17 09:35:25.000	15	30	10	hoechste Dichte in Strassenboeschung
2022/10/17 10:01:10.000	10	20	20	Pflanzen geballt am Oberhang, sonst fast keine, dumi
2022/10/17 10:40:39.000	5	9	30	Wundklee abnehmend, keine Pflanzen in Pflegeflaeche
2022/10/17 12:34:00.000	10	20	30	Eselweide, Wundklee ueberdurchschnittlich haeufig, kurzgefressen, 2 Esel, guter dorylas Besatz
2022/10/17 13:05:36.000	3	5	10	zerstreut Wundklee, schöne Trespen-Wiese, Besatz dorylas hoch
2022/10/17 13:22:08.000	4	4	10	zerstreut Wundklee, schöne Trespen-Wiese, Besatz dorylas hoch, dumi
2022/10/17 13:30:13.000	3	6	10	zerstreut Wundklee, schöne Trespen-Wiese, Besatz dorylas hoch
2022/10/17 14:38:13.000	4	5	30	zerstreut Wundklee
2022/10/17 14:51:46.000	1	3	20	vereinzelt Wundklee
2022/10/17 15:30:58.000	12	15	15	reichlich Wundklee, vitale Pflanzen, relativ frisch, nicht vertrocknet, Weide
2023-10-12T10:34:11.000Z	3	4	20	
2023-10-12T12:40:13.000Z	0	1	20	kaum Wundklee, trocken
2023-10-12T13:02:56.000Z	0	5	30	
2023-10-12T13:45:03.000Z	0	5	10	
2023-10-12T14:00:16.000Z	3	2	30	
2024-10-17T09:12:32.000Z	7	40	60	Großacker, Wundklee einigermassen erholt



Zusammenfassung

- Kalk-Magerrasen bis Salbei-Glatthaferwiesen
- Meist gemäht, seltener beweidet
- Mahd im Juni oder August wegen Grünwidderchen
- Oft gemeinsam mit Grünwidderchen
- Überwiegend SW-Exponiert



A photograph of a grassy hillside with several trees. The foreground is filled with tall, dry grass and some green plants. In the middle ground, there are several trees, including some with bare branches and some with green leaves. The background shows a line of trees on a ridge under a cloudy sky.

Arbeiten im Auftrag des
Regierungspräsidiums Freiburg
Artenschutzprogramm
Schmetterlinge

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

