

Internetanhang zum Beitrag:

GERISCH M. & A. SCHANOWSKI (2009): Differenzierung von Laufkäfergemeinschaften (Col., Carabidae) an der Mittleren Elbe am Beispiel des Roßläuer Oberluchs In: 30 Jahre Biosphärenreservat Mittelelbe. Forschung und Management im Biosphärenreservat Mittelelbe. Naturschutz im Land Sachsen Anhalt. 46. Jg., Sonderheft 2009/1: 124-129.

Anhang Tab.: Darstellung der Gesamtartnachweise nach Untersuchungsgebieten und Haupt-Habitattypen.

Artnamen (Author)	Σ	Roßläu						Kleien			RL LSA
		vordeichs			hinterdeichs			GFr	GF	GM	
		GFr	GF	GM	GFr	GF	GM	GFr	GF	GM	
<i>Acupalpus exiguus</i> (Dejean, 1829)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
<i>Agonum emarginatum</i> (Duftschmid, 1812)	7	1	0	0	4	1	0	1	0	0	
<i>Agonum duftschmidi</i> (Schmidt, 1994)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
<i>Agonum marginatum</i> (Linné, 1758)	5	0	0	0	3	1	1	0	0	0	
<i>Agonum micans</i> (Nicolai, 1822)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Agonum versutum</i> (Sturm, 1824)	6	1	1	0	4	0	0	0	0	0	
<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
<i>Amara aulica</i> (Panzer, 1797)	30	0	2	0	0	18	3	0	2	5	
<i>Amara bifrons</i> (Gyllenhal, 1810)	74	0	1	0	1	5	14	0	53	0	
<i>Amara communis</i> (Panzer, 1797)	16	0	0	0	2	2	10	2	0	0	
<i>Amara convexior</i> (Stephens, 1828)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
<i>Amara equestris</i> (Duftschmid, 1812)	247	0	5	31	0	6	36	0	86	83	
<i>Amara eurynota</i> (Panzer, 1797)	4	0	0	0	0	0	3	0	1	0	
<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
<i>Amara lunicollis</i> (Schiodte, 1837)	55	0	1	1	1	1	4	44	0	3	
<i>Amara municipalis</i> (Duftschmid, 1812)	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	
<i>Amara plebeja</i> (Gyllenhal, 1810)	12	0	0	0	9	2	0	1	0	0	
<i>Amara similata</i> (Gyllenhal, 1810)	13	11	0	0	0	1	0	0	0	1	
<i>Amara strenua</i> (Zimmermann, 1832)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	R
<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)	340	9	1	1	26	5	9	287	2	0	
<i>Anthracus consputus</i> (Duftschmid, 1812)	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
<i>Badister bullatus</i> (Schränk, 1798)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Bembidion biguttatum</i> (Fabricius, 1779)	28	24	0	0	2	0	0	2	0	0	
<i>Bembidion dentellum</i> (Thunberg, 1787)	59	56	0	0	0	0	0	3	0	0	
<i>Bembidion gilvipes</i> (Sturm, 1825)	35	7	0	6	3	0	0	18	1	0	
<i>Bembidion guttula</i> (Fabricius, 1792)	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	
<i>Bembidion lunulatum</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
<i>Bembidion obtusum</i> (Audinet-Serville, 1821)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
<i>Bembidion properans</i> (Stephens, 1828)	10	0	5	0	0	0	1	0	3	1	
<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linné, 1761)	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Bembidion tetracolum</i> (Say, 1823)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
<i>Blethisa multipunctata</i> (Linné, 1758)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
<i>Bradycellus harpalinus</i> (Audinet-Serville, 1821)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
<i>Calathus fuscipes</i> (Goeze, 1777)	319	1	0	0	1	3	44	2	94	174	
<i>Calathus melanocephalus</i> (Linné, 1758)	108	0	3	4	7	12	75	0	2	5	
<i>Carabus auratus</i> (Linné, 1761)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
<i>Carabus granulatus</i> (Linné, 1758)	13	1	1	3	2	2	1	1	1	1	
<i>Carabus nemoralis</i> (O.F. Müller, 1764)	5	0	0	0	0	0	1	0	3	1	
<i>Chlaenius nigricornis</i> (Fabricius, 1787)	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	
<i>Cicindela campestris</i> (Linné, 1758)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
<i>Clivina fossor</i> (Linné, 1758)	134	8	81	6	10	5	3	16	5	0	
<i>Diachromus germanus</i> (Linné, 1758)	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	R
<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	
<i>Epaphius secalis</i> (Paykull, 1790)	13	8	2	1	0	0	0	2	0	0	
<i>Harpalus affinis</i> (Schränk, 1781)	35	0	5	1	0	20	9	0	0	0	
<i>Harpalus distinguendus</i> (Duftschmid, 1812)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
<i>Harpalus latus</i> (Linné, 1758)	5	0	2	2	0	1	0	0	0	0	
<i>Harpalus luteicornis</i> (Duftschmid, 1812)	7	0	0	0	5	0	2	0	0	0	
<i>Harpalus melancholicus</i> (Dejean, 1829)	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1
<i>Harpalus rubripes</i> (Duftschmid, 1812)	8	0	0	0	1	0	7	0	0	0	
<i>Leistus ferrugineus</i> (Linné, 1758)	13	1	0	0	0	1	1	5	4	1	
<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
<i>Microlestes minutulus</i> (Goeze, 1777)	12	0	1	0	0	0	3	0	5	3	
<i>Nebria brevicollis</i> (Fabricius, 1792)	28	0	0	8	4	4	6	0	5	1	
<i>Notiophilus aquaticus</i> (Linné, 1758)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)	14	1	0	0	5	5	2	1	0	0	
<i>Ophonus diffinis</i> (Dejean, 1829)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	R
<i>Ophonus puncticeps</i> (Stephens, 1828)	5	0	0	0	0	0	0	0	4	1	
<i>Ophonus rufibarbis</i> (Fabricius, 1792)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
<i>Oxytelus obscurus</i> (Herbst, 1784)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Patrobus atrorufus</i> (Stroem, 1768)	325	285	21	8	1	5	0	5	0	0	
<i>Platynus assimilis</i> (Paykull, 1790)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<i>Platynus livens</i> (Gyllenhal, 1810)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<i>Poecilus cupreus</i> (Linné, 1758)	2197	87	157	207	620	250	377	26	60	413	
<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)	2089	20	26	78	298	28	1485	35	16	103	
<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)	281	9	35	4	22	118	51	34	6	2	

Artnamen (Author)	Σ	Roßblau						Klieken			RL LSA
		vordeichs			hinterdeichs			GFr	GF	GM	
		GFr	GF	GM	GFr	GF	GM				
<i>Pterostichus anthracinus</i> (Illiger, 1798)	48	20	1	3	11	3	1	7	2	0	
<i>Pterostichus gracilis</i> (Dejean, 1828)	12	5	0	0	3	3	0	1	0	0	
<i>Pterostichus melanarius</i> (Illiger, 1798)	2114	35	393	769	64	255	114	21	303	160	
<i>Pterostichus minor</i> (Gyllenhal, 1827)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
<i>Pterostichus niger</i> (Schaller, 1783)	45	16	0	1	2	10	1	6	9	0	
<i>Pterostichus nigrita</i> (Paykull, 1790)	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	
<i>Pterostichus strenuus</i> (Panzer, 1797)	15	2	1	0	6	1	0	5	0	0	
<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)	70	14	1	2	20	4	1	27	1	0	
<i>Stenolophus mixtus</i> (Herbst, 1784)	5	4	0	0	0	0	0	1	0	0	
<i>Stomis pumicatus</i> (Panzer, 1796)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
<i>Syntomus truncatellus</i> (Linné, 1761)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
<i>Synuchus vivalis</i> (Illiger, 1798)	6	0	0	3	0	0	0	0	3	0	
<i>Trechus obtusus</i> (Erichson, 1837)	6	0	1	0	0	0	0	5	0	0	
<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)	172	1	122	35	0	10	3	1	0	0	
<i>Zabrus tenebrioides</i> (Goeze, 1777)	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	

Abk.: GFR – Flutrinnen, GF – Feuchtes Grünland, GM – Mesophiles Grünland.

Abk.: RL LSA = Rote Liste (Sachsen-Anhalt), Einstufung erfolgte nach Schnitter, P. & M. Trost (2004): Rote Liste der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) des Landes Sachsen-Anhalt. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 39: 252-263.