


Internetanhang zum Beitrag:


UNRUH, M., BERBIG, A. & A. ZEHLE (2009): Zur Situation der Urzeitkrebse und Rückenschaler im Biosphärenreservat Mittelelbe. In: 30 Jahre Biosphärenreservat Mittelelbe. Forschung und Management im Biosphärenreservat Mittelelbe. Naturschutz im Land Sachsen Anhalt. 46. Jg., Sonderheft 2009/1: 150-158.

Fundortübersicht der Nachweise von *Lepidurus apus*, *Triops cancriformis* sowie *Eubbranchipus (Siphonophanes) grubii* und *Branchipus schaefferi* im Biosphärenreservat Mittelelbe der Jahre 2004-2008




Lepidurus apus L.

Abb.1a: *Lepidurus apus* L. 1758, (Quelle: Kartierungsergebnisse 2004-2008, zusammengestellt von A. Berbig unter Verwendung der Kartengrundlage des LAU)




Triops cancriformis L.

Abb.1b: *Triops cancriformis* L., (Quelle: Kartierungsergebnisse 2004-2008, zusammengestellt von A. Berbig unter Verwendung der Kartengrundlage des LAU)



Branchipus schaefferi FISCHER, 1834

Abb. 1c: Branchipus schaefferi FISCHER, 1834, (Quelle: Kartierungsergebnisse 2004-2008, zusammengestellt von A. Berbig unter Verwendung der Kartengrundlage des LAU)



Siphonophanes grubei (DUB.)

Abb.1d: Eubbranchipus (*Siphonophanes*) *grubii* (DUB.), (Quelle: Kartierungsergebnisse 2004-2008, zusammengestellt von A. Berbig unter Verwendung der Kartengrundlage des LAU)